



Basfoliar[®] Ca N SL

Nombre comercial	Basfoliar [®] Ca N SL
Nombre químico	Solución inorgánica en base a sales de calcio
Nombre común	Fertilizante Foliar Cálxico
Grado	AGRÍCOLA
Producido por	COMPO GmbH & Co
Comercializado por	COMPO AGRO Chile Ltda.

ANÁLISIS QUÍMICO

Calcio	16	% Ca	p/v
Nitrógeno	13	% N	p/v
Magnesio	0,9	% Mg	p/v
Manganeso	0,6	% Mn	p/v
Boro	0,3	% B	p/v
Zinc	0,015	% Zn	p/v

ANÁLISIS FÍSICO

APARIENCIA	Solución incolora e inodora
DENSIDAD a 20°C	1,5
TOXICIDAD	NO TÓXICO, NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO y NO PELIGROSO
ENVASES	BIDONES PLÁSTICOS DE : 1L,5L,20L y 200L

USOS

Fertilizante foliar líquido en base a calcio, nitrógeno, elementos secundarios y microelementos. **Basfoliar[®]Ca N SL** no sólo controla desórdenes fisiológicos relacionados con la deficiencia de calcio (bitter pit), si no que también aumenta la firmeza, tamaño y previene la caída prematura de hojas.



Basfoliar® Ca N SL

DESCRIPCIÓN

- **Basfoliar® Ca N SL** controla desórdenes fisiológicos por deficiencia de Calcio y aumenta el calibre.
- **Basfoliar® Ca N SL**, además de Ca y N contiene otros nutrientes que le permiten vigorizar plantas débiles, aumentar el calibre de los frutos, prevenir la caída prematura de hojas (especialmente en manzanos var. Fuji).

PROPIEDADES Y VENTAJAS

- **Basfoliar® Ca N SL** controla desórdenes fisiológicos relacionados con la deficiencia de Calcio como ablandamiento prematuro de frutos, Bitter pit, corcho, lenticel blotch pit en pomáceas, necrosis apical en tomates, pimentones y cucurbitáceas, tip burn en lechugas y repollos.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS	Concentración	N° aplic.	OBSERVACIONES
Manzanos	4 - 6 l/ha	0,2 – 0,5 %	4 a 6	En Var. poco sensibles a Bitter Pit
	6 a 10 l/ha	0,2 – 0,6 %	6 a 8	En var. muy sensibles a Bitter Pit
Carozos	1,5 a 4,5 l/ha	0,1 – 0,3 %	2 a 3	Mejora firmeza del fruto
Berries	1,5 a 2,5 l/ha	0,25 -0,5%	2 a 3	Mejora firmeza del fruto
Frutillas	1,5 a 4,5 l/ha	0,1 – 0,3 %	2 a 3	Aumenta el tamaño y la firmeza
Tomate	2 l/ha	0,2 %	5 a 6	Aplicar en cada floración
Pimentón	3 l/ha	0,3 %	5 a 6	Aplicar desde inicio de floración
Coles	12 l/ha	1,2 %	3 a 5	Aplicar antes de la formación de la cabeza
Lechuga, endivia	2l/ha	0,2 %	2	Aplicar 2 semanas antes después del transplante

CUIDADOS

Basfoliar® Ca N SL es considerado no tóxico. Por lo tanto, para el manejo del producto, es necesario atenerse a las precauciones de uso del o los productos fitosanitarios con que sea mezclado **Basfoliar® Ca N SL**.

Basfoliar® es marca registrada de COMPO Alemania