



Precisión Alemana
en Nutrición Vegetal

Basfoliar[®] K (N)

Nombre Comercial	Basfoliar [®] K(N)
Nombre Químico	Fertilizante Foliar inorgánico basado en sales minerales de potasio, magnesio y cinc.
Nombre común	Basfoliar K(N)
Grado	AGRÍCOLA
Producido y comercializado por	COMPO AGRO Chile Ltda.

ANÁLISIS QUÍMICO

Potasio (K ₂ O).....	350 g/kg (35% K ₂ O)
Nitrógeno (N)	100 g/kg (10% N)
Magnesio (Mg).....	30 g/kg (3% Mg)
Cinc (Zn)	30 g/kg (3% Zn)

ANÁLISIS FÍSICO

APARIENCIA	Polvo blanco inodoro
DENSIDAD a 20°C	0,9
PH (Sol 50g/l H ₂ O)	6,0
TOXICIDAD	NO TOXICO, NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO Y NO PELIGROSO
ENVASES	SACOS 25 Y 5 kg



Basfoliar[®] K (N)

BENEFICIOS

- Estimula la formación y traslocación de carbohidratos (azúcares).
- Da a la planta mayor resistencia al déficit hídrico alcanzando potencial de solutos en los tejidos y células conductivas, y regulando la apertura y cierre de los estomas.
- Mejora la tolerancia a climas fríos y enfermedades.
- Esencial para la producción de aceite.

DESCRIPCIÓN

Basfoliar[®] K(N) ha sido formulado con materias primas de alta calidad, evitando todo riesgo de fruta manchada, incluso días antes de la cosecha.

Basfoliar[®] K(N) es recomendado como complemento de fertilización al suelo.

PROPIEDADES Y VENTAJAS

Basfoliar[®] K(N) usado en las últimas fases de crecimiento y maduración celular de frutas y hortalizas, mejora el tamaño y color de fruto cuando es aplicado en el último tercio de crecimiento del fruto, momento de alta demanda de potasio.



Basfoliar® K (N)

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis Kg/ha	Aplicaciones	Observaciones
Carozos	3 a 4	2 – 3	Aplicar desde brote de 15 a 20 cm, hasta antes de endurecimiento del carozo
Uva de mesa y Vides	3 a 4	2 – 3	Aplicar desde brote de 15 a 20 cm. hasta antes de tinta
Pomáceas	3 a 4	2 – 3	En variedades Vigorosas aplicar hasta 60 días antes de Cosecha. En huertos con poco vigor aplicar hasta 20 días antes de cosecha.
Post cosecha de frutales de hoja caduca y vides	7 a 10	2 – 3	Aplicar sólo si el análisis foliar indica deficiencia
Kiwi	3 a 4	2 – 3	Aplicar desde brote de 15 a 20 cm. hasta antes del llenado de frutos.
Cítricos y Paltos	4 a 6	2 – 3	Aplicar cada 15 a 20 días a partir de la cuaja del fruto.
Hortalizas de Hoja	1 a 1,5	2	Aplicar 40 y 60 días después de 3 a 4 hojas
Hortalizas de fruto	1 a 3	1 -2	Aplicar 1 a 2 veces después de la cuaja del fruto
Almácigos	1	2	Aplicar 20 y 30 días después de la germinación
Ajo, cebolla, puerro	1,5 a 3	1	Aplicar al inicio de la formación del bulbo
Papa	1 a 1,5	1	Aplicar 70 días post – emergencia
Maíz	1,2	2	Aplicar al inicio y a la mitad de la formación de la mazorca
Cereales	1	2	Aplicar en la emisión de la hoja bandera y al llenado de grano
Remolacha	1,2	2	Aplicar 45 y 30 días antes de la cosecha
Flores de Corte	2	1	Aplicar antes de la formación del botón floral



Precisión Alemana
en Nutrición Vegetal

Basfoliar[®] K (N)

COMPATIBILIDAD

Basfoliar[®] K(N) es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común.

PRECAUCIONES

Basfoliar[®] K(N) es considerado no tóxico para las plantas ni animales. Por lo tanto para el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso de los productos fitosanitarios con los cuales ha sido mezclado **Basfoliar[®] K(N)**.

Basfoliar[®] es marca registrada de COMPO Alemania