



# Basfoliar<sup>®</sup> Mg

Nombre Comercial	Basfoliar <sup>®</sup> Mg WP
Nombre Químico	Polvo fino amorfo de naturaleza inorgánica en base a sales y óxido de magnesio
Nombre Común	Basfoliar <sup>®</sup> Mg WP
Grado	AGRICOLA
Comercializado por	COMPO AGRO Chile Ltda.

## ANÁLISIS QUÍMICO

Magnesio ..... 400 g/Kg (40 % Mg p/p)

## ANÁLISIS FÍSICO

APARIENCIA	Sólido blanco, inodoro
DENSIDAD a 20°C	0,4 mg/cc
PH (Sol. 50g/L H <sub>2</sub> O) (20°C)	8,2
TOXICIDAD	MODERADAMENTE TÓXICO, NO ES INFLAMABLE, NO CORROSIVO Y NO PELIGROSO
EMPAQUES	Sacos de 25 y 5 kg. Cajas de 1 kg.

## BENEFICIOS

- El Magnesio es el constituyente central de la molécula de clorofila, por lo tanto es indispensable para una buena fotosíntesis.
- Aumenta la producción de carbohidratos en la planta, mejorando el contenido de azúcares de la fruta.

## DESCRIPCIÓN

- **Basfoliar<sup>®</sup> Mg WP** es un fertilizante foliar polvo mojable de alta concentración (40%)
- **Basfoliar<sup>®</sup> Mg WP** es un producto Corrector de deficiencias de magnesio de gran eficiencia para especies frutales y cultivos.



# Basfoliar® Mg

## RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivo	Dosis kg/ha	N° de aplicaciones	Observaciones
Pomáceas	5	2 a 3	Realizar 2 a 3 aplicaciones después de caída de pétalos cada 10 a 15 días. Evitar condiciones de clima con alta humedad relativa ya que puede producir russet, especialmente en peras D´Anjou.
Carozos	5	2 a 3	Realizar 1 a 2 aplicaciones después de caída de pétalos cada 10 a 15 días
Parronales y viñas	2 a 2,5	1	Pre-floración: Al observar clorosis temprana, a partir de brotes de 40 cm.
	4 a 5	2 a 3	Preventivamente desde baya cuajada a pinta. Correctivamente desde pinta a cosecha. Para atenuar “palo negro”, bayas acuosas y bayas débiles.
Post cosecha, frutales de hoja caduca	5	1 a 3	Para atenuar la caída temprana de hojas.
Cítricos y paltos	5	2	1ª Flujo de crecimiento de brotes en primavera (brotes nuevos). 2ª Flujo de crecimiento de brotes en otoño (brotes nuevos)
Hortalizas y cultivos	2 a 2,5	2 a 3	Cada 7 a 10 días

## PRECAUCIONES

**Basfoliar® Mg WP** es un fertilizante foliar inorgánico, no está sujeto a exigencias de residuos ni a períodos de carencia. Sin embargo en frutales de carozo se recomienda suspender las aplicaciones tres semanas antes de cosecha, ya que pueden quedar depósitos visibles.

**Basfoliar® Mg WP** es considerado no tóxico. Por lo tanto, para el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso del o los productos fitosanitarios con que sea mezclado **Basfoliar® Mg WP**.

**Basfoliar®** es marca registrada de COMPO Alemania.