

COMPO EXPERT

EXPERTS
FOR GROWTH



Basfoliar[®] Zn75 flo

Fertilizante foliar

Formulación líquida floable

www.compo-expert.com/cl

Basfoliar® Zn75 flo

Fertilizante foliar, formulación líquida floable

Basfoliar Zn75 flo es un fertilizante foliar líquido – floable con alta concentración de Zinc, especialmente desarrollado para aplicaciones de bajo volumen.

Basfoliar Zn75 flo es un corrector de deficiencias de Zinc de rápida eficacia y persistencia a las lluvias.

Composición

Zinc 750 g/L (75% Zinc p/v)

Recomendaciones de Uso

Cultivo	Concentración/ aplicación	Dosis aplicación/ha	N° aplicaciones	Época de Aplicación
Uva de mesa y Vid vinífera	50-100 cc/100 L	0,7 L	2	1ª aplicación con brote de 40 cm y la 2ª inicios de flor. Si existen antecedentes de deficiencia partir con brote de 20 cm.
Durazneros, nectarines, almendros	50 cc/100 L	0,5 L	3	Aplicar en 3 oportunidades, partiendo con brote de 5 a 10 cm, repitiendo cada 10 a 15 días, llegando a los 1,5 L /ha de producto comercial en la primavera.
	40 cc/100 L	0,5 L		
	30 g/100 L	0,5 L		
	70 cc/100 L	1,2-1,5 L	1	Aplicar en otoño (marzo) con hoja verde activa, sólo si análisis de lámina indicó menos de 20 ppm de Zinc.
Ciruelos	40 cc/100 L	0,4 L	2	Aplicar en 2 oportunidades en primavera, y no más de 600-700 gr de Zinc/ ha en la temporada. Las variedades Early Queen, Fortune, Black Ambar y Larry Ann, son especialmente susceptibles a toxicidad por Zinc.
	30 cc/100 L	0,4 L		
	70 cc/100 L	1 a 1,5 Kg	1	Aplicar en otoño (Marzo) con hoja verde activa, sólo si análisis de lámina indicó menos de 20 ppm de Zinc.
Pomáceas	50 cc/100 L	0,6 L	1	Puntas verdes con mojamiento aprox. de 1.200 l /ha.
	25-40 cc/ 100 L	0,4-0,6 L	2 - 4	Desde fruto de 2-3 cm. Aplicando cada 10 días.
	80 cc/100 L	1,0-1,5 L	1	Aplicar en otoño (marzo) con hoja verde activa, sólo si análisis de lámina indicó menos de 20 ppm de Zinc.
Cítricos y paltos	100-200 cc/100 L	1,5 L	2	Aplicar en flujos de crecimiento de brotes de primavera y otoño (brotes nuevos). Suficiente con mojar la periferia del árbol.
Kiwis	30 g/100 L	0,15-0,20 L	2	Aplicar desde brote de 20 cm cada 15 días (mojamiento de 600 a 800 L/ha).
Nogales	30 cc/100 L	0,5-0,7 L	3	Realizar la 1ª aplicación en inicio de flor pistilada y repetir cada 15 días.
	60 cc/100 L	1,2-1,5 L	1	Aplicar en otoño (marzo) con hoja verde activa, sólo si análisis de lámina indicó menos de 20 ppm de Zinc.
Olivos	100-200 cc/100 L	0,7-1,0 L	2 - 3	Aplicar en flujos de crecimiento de brotes de primavera hasta antes de floración mezclado con Solubor®. Se puede repetir en otoño si los niveles son bajos.
Berries (arándanos, frambuesas, frutillas)	100 cc/100 L	0,5-0,8 L	1-2	Aplicar con brote activo antes de floración.
Viveros y plantaciones nuevas	40 cc/100 L	0,1 - 0,2 L	1 - 3	Aplicar desde brote de 20 cm cada 15 días.
Ajo, cebolla	100 cc/100 L	1 L	2	30 y 60 días después del trasplante
Hortalizas	150-200 cc/100 L	0,5 a 0,8 L	1 - 3	Desde brote activo y repetir cada 10 a 15 días.
Maíz	200 cc/100 L	1 L	1 - 3	Desde 6 hojas en adelante
Cereales	150-200 cc/100 L	0,5 a 0,8 L	1 - 3	Desde brote activo y repetir cada 10 a 15 días.
Raps	150 cc/100 L	1 - 1,5 L	2	Realizar la 1ª aplicación en estado de roseta junto a Solubor®, y la 2ª inicio de flor junto a Solubor®.
Maravilla	150 cc/100 L	1 - 1,5 L	2	Realizar la 1ª aplicación en estado de estrella junto a Solubor®, y 2ª inicio de flor junto a Solubor®.

Compatibilidad

Basfoliar Zn75 flo es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso convencional.

www.compo-expert.com/cl

Basfoliar es marca registrada COMPO Alemania.

COMPO AGRO Chile Ltda.
Isidora Goyenechea 3621 - Piso 5
Las Condes - Santiago
Fono: (2) 597 8400
Fax: (2) 597 8401
E-Mail: info@compo.cl

Consultas Técnicas en Regiones:

I a IV Región: 09-9342 0555
V Región: 09-9343 2222
R.M.: 09-9343 7821
VI Región Norte: 09-9328 8780

VI Región Sur: 09-9344 7392
VII Región: 09-9345 7561
VIII Región: 09-8501 9958
IX, XIV y X Región: 09-9440 4920

Soporte Técnico

Joaquín Orellana: 09-9344 5246
Hernán Camacho: 09-9227 8339