



MATECZNIKI PODKŁADEK WEGETATYWNYCH

PIERWSZY ROK PROWADZENIA MATECZNIKA

I. NAWOZY GRANULOWANE

Blaukorn® classic 12-8-16

całkowita dawka roczna [kg/ha]	termin stosowania
300-400	wiosna – przed sadzeniem

NovaTec® classic 12-8-16

całkowita dawka roczna [kg/ha]	termin stosowania
300-500	4 tygodnie po posadzeniu

II. NAWOZY DOLISTNE

Basfoliar® SP 13-40-13

stężenie [%]	ilość dawek w roku	termin stosowania
0,3-0,5%	4	dolistnie co 10-14 dni od czerwca do końca lipca

Basfoliar® Aktiv

stężenie [%]	ilość dawek w roku	termin stosowania
0,5%	3	oprysk co 10-14 dni do końca sierpnia. wzmacnia odporność na choroby grzybowe oraz witalność podkładek

COMPO Frost Protect

całkowita dawka roczna [l/ha]	ilość dawek w roku	termin stosowania	cel stosowania
1 – 1,2	1	24 – 48 godzin przed wystąpieniem przymrozku	ochrona przed skutkami wiosennych przymrozków



MATECZNIKI PODKŁADEK WEGETATYWNYCH

PIERWSZY ROK ODEJMOWANIA PODKŁADEK

I. NAWOZY GRANULOWANE

Blaukorn[®] classic 12-8-16

całkowita dawka roczna [kg/ha]	termin stosowania
200-300	wiosną przed odsłonięciem matecznika

NovaTec[®] classic 12-8-16

całkowita dawka roczna [kg/ha]	termin stosowania
300-500	po odgarnięciu trocin

II. NAWOZY DOLISTNE

Basfoliar[®] SP 13-40-13

stężenie [%]	ilość dawek w roku	termin stosowania
0,3-0,5%	2-4	dolistnie co 10-14 dni od czerwca do sierpnia

Basfoliar[®] Aktiv

stężenie [%]	ilość dawek w roku	termin stosowania
0,5%	3	oprysk co 10-14 dni do końca sierpnia. wzmacnia odporność na choroby grzybowe oraz witalność podkładek

Basfoliar[®] Kelp P-Max

stężenie [%]	ilość dawek w roku	termin stosowania
0,5%	2	oprysk co 10-14 dni od połowy czerwca. Stymulacja wzrostu korzeni



MATECZNIKI PODKŁADEK WEGETATYWNYCH

COMPO Frost Protect

całkowita dawka roczna [l/ha]	ilość dawek w roku	termin stosowania	cel stosowania
1 – 1,2	1	24 – 48 godzin przed wystąpieniem przymrozku	ochrona przed skutkami wiosennych przymrozków

KOLEJNE LATA PROWADZENIA MATECZNIKA

I. NAWOZY GRANULOWANE

Blaukorn® classic

całkowita dawka roczna [kg/ha]	termin stosowania
200-300	wiosną przed odśnieżeniem matecznika

NovaTec® classic

całkowita dawka roczna [kg/ha]	termin stosowania
400-600	po odgarnięciu trocin

II. NAWOZY DOLISTNE

Basfoliar® SP 20-20-20

stężenie [%]	ilość dawek w roku	termin stosowania
0,3-0,5%		dolistnie co 10-14 dni od czerwca do sierpnia

Basfoliar® Aktiv

stężenie [%]	ilość dawek w roku	termin stosowania
0,5%	3	oprysk co 10-14 dni do końca sierpnia. wzmacnia odporność na choroby grzybowe oraz vitalność podkładek



MATECZNIKI PODKŁADEK WEGETATYWNYCH

Basfoliar® Kelp P-Max

stężenie [%]	ilość dawek w roku	termin stosowania
0,5%	2	oprysk co 10-14 dni od połowy czerwca. Stymulacja wzrostu korzeni

COMPO Frost Protect

całkowita dawka roczna [l/ha]	ilość dawek w roku	termin stosowania	cel stosowania
1 – 1,2	1	24 – 48 godzin przed wystąpieniem przymrozku	ochrona przed skutkami wiosennych przymrozków

UWAGA: Powyższe zalecenia mają charakter ogólny. Podstawą racjonalnego nawożenia jest przeprowadzenie analizy gleby oraz monitorowanie kondycji uprawy.