

EXPERTS  
FOR GROWTH



Basfoliar®

Combi Stipp SL

Mikro Elementli Sıvı Kalsiyum

- Mikro elementlerle zenginleştirilmiş, etkili ve özel bir kalsiyum kaynağıdır.
- Bitkiler tarafından alınabilirliği çok yüksektir.
- Özellikle elmada acı benek ve domateste çiçek burnu çürüklüğü sorununa karşı idealdir.
- İçeriğindeki mikro elementlerle enzimlerin aktivitesini destekler.
- Üretiminde kullanılan hammaddeler çok kalitelidir.
- Tüm bitkilerde kaliteyi artırır, raf ömrünü uzatır.
- Hücre duvarlarını güçlendirerek hastalık ve zararlılara karşı bitkiye daha dayanıklı bir yapı kazandırır.



Bitki Besleme Uzmanı



## Basfoliar® Combi Stipp SL



### Garanti Edilen İçerik

	w/w
Toplam Azot (N)	% 9
Nitrat Azotu (NO <sub>3</sub> )	% 9
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	% 15
Suda Çözünür Bor (B)	% 0.2
Suda Çözünür Mangan (Mn)*	% 0.4
Suda Çözünür Çinko (Zn)*	% 0.01

\* Tüm metaller EDTA ile şelatlanmıştır.  
EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı : 4.0 - 8.0

### Uygulamalarla İlgili Tavsiyeler

Basfoliar® Combi Stipp SL'nin etkisini korumak ve zirai mücadele ilaçları ile uygulama yapmak amacıyla, tanka sırasıyla; Su, Basfoliar® Combi Stipp SL ve en son olarak da ilaç eklenmeli, uygulama zaman geçirilmeden yapılmalıdır.

**Dikkat:** Bitki besleme ürünleri ile karışım halinde uygulama yapmayınız! Her ne kadar birçok zirai mücadele ilacı ile karışımı mümkünse de, uygulamadan önce, küçük bir alanda ön karışım testi yapılması önerilir.

### Basfoliar® Combi Stipp SL Uygulama Önerileri

Uygulama Alanı	Yapraktan Uygulama Miktarı cc/100 litre su	Uygulama Sayısı
<b>Domates, Biber, Patlıcan ve diğer Sebzeler</b> (Meyve tutum döneminden itibaren 15 - 20 gün ara ile 4 - 5 uygulama)	200 - 300	4 - 5
<b>Hıyar</b> (Meyve oluşum döneminden itibaren, hasat boyunca 15 gün ara ile 4 - 5 uygulama)	200 - 300	4 - 5
<b>Elma, Armut ve Ayva</b> (Küçük meyve devresinden itibaren 15 - 20 gün ara ile 4 - 5 uygulama)	200 - 300	4 - 5
<b>Şeftali, Kayısı ve Nektarin</b> (Küçük meyve devresinden itibaren 15 - 20 gün ara ile 4 - 5 uygulama)	200 - 300	4 - 5
<b>Turunçgiller, Muz ve Zeytin</b> (Küçük meyve devresinden itibaren 15 - 20 gün ara ile 4 - 5 uygulama)	200 - 300	4 - 5
<b>Kiraz ve Erik</b> (Küçük meyve devresinden itibaren 15 - 20 gün ara ile 4 - 5 uygulama)	200 - 300	4 - 5
<b>Çilek, Bağ ve diğer Üzümsü Meyvelerde</b> (Küçük meyve devresinden itibaren 15 - 20 gün ara ile 4 - 5 uygulama)	200 - 300	4 - 5

#### COMPO Agro Specialities

Barbaros Mah. Çiğdem Sok. Ağaoğlu My Office  
No:1 Kat:8 D:37 34746 Ataşehir / İSTANBUL  
Tel : +90 (216) 688 51 18 Fax : +90 (216) 688 51 17  
[www.compo-expert.com/tr](http://www.compo-expert.com/tr) [info.tr@compo.com](mailto:info.tr@compo.com)  
[facebook.com/COMPO Expert Turkey](https://www.facebook.com/COMPO-Expert-Turkey)



#### İthalatçı Firma:

