

EXPERTS FOR GROWTH



Basfoliar[®] *Premium* SL

Fertilizante Foliar

Fórmula Líquida Bio-potenciada

www.compo-expert.cl



Basfoliar® K Premium SL



Fertilizante Foliar, Fórmula Líquida Bio-potenciada

Basfoliar K Premium SL es un fertilizante foliar líquido con alta concentración de Potasio, potenciado con extractos de Algas Marinas (*Ecklonia maxima*) y Boro.

La combinación de elementos que componen **Basfoliar K Premium SL** favorecen:


- Color y tamaño del fruto.
- Formación y movilización de carbohidratos hacia el fruto (azúcares).
- Estimulación de la fotosíntesis.
- Vida post cosecha de frutos almacenados en frío.
- Síntesis de lignina
- Tolerancia a climas fríos, enfermedades y resistencia a estrés por falta de agua.

La formulación de **Basfoliar K Premium SL** (líquido) y la alta calidad de sus materias primas evitan riesgos de fruta manchada, incluso aplicado el día antes de la cosecha.

Composición

Potasio (K ₂ O)	25% (p/v)
Ecklonia maxima (extracto de algas)	3% (p/v)
Boro (B)	1% (p/v)

Carga Electrostática:



Basfoliar K Premium SL, en dosis de 7 L/ha. Carga Mínima de la Solución recomendada durante la aplicación: 6 Microamperes.

Sin Problemas de Tapado en Boquillas

Como se observa en el gráfico, **Basfoliar K Premium SL** presenta un excelente comportamiento en aplicaciones con máquina electrostática, manteniendo sin alteración una carga eléctrica adecuada en la solución y sin problemas de obstrucción en las boquillas durante la aplicación.

Recomendaciones de Uso

Cultivo	N° de aplicaciones	Dosis	Época de aplicación
Vid (de mesa y vinífera)	2 a 3	6 a 8 L/ha	Desde pinta en adelante cada 7 a 15 días.
Pomáceas	3	6 a 8 L/ha	Aplicar cada 15 a 21 días (60, 40 y 20 días antes de cosecha).
Carozos	2 a 3	6 a 8 L/ha	Aplicar cada 7 días en variedades tempranas y cada 15 días en variedades tardías, desde desarrollo intermedio de fruto a inicio de color.
Cerezos	2	7 L/ha	Aplicar al menos 2 veces cada 5 días, 10 y 15 días antes de cosecha. Última aplicación 10 días antes de cosecha.
Kiwi	4	6 a 8 L/ha	Aplicar desde 60 días antes de cosecha, cada 15 días, 40, 50, 60 y 70 días después de plena flor.
Nogales y Avellano Europeo	2	5 L/ha	Aplicar 30 y 15 días antes de pre cosecha junto con Basfoliar Algae SL o Basfoliar Kelp SL .
Olivos	1 a 2	7,5 L/ha	Aplicar cada 20 días en el último tercio de crecimiento de frutos.
Frutales de hoja persistente (Cítricos y Paltos)	2 a 3	6 a 8 L/ha	Aplicar cada 7 a 15 días a partir de la cuaja de los frutos.
Frambuesas y Arándanos	2 a 3	3 a 5 L/ha	Aplicar desde el primer cuaje de frutos, cada 10 a 12 días.
Frutillas	2 a 3	2,5 a 3 L/ha	Aplicar desde el primer cuaje de frutos, cada 10 a 12 días.
Tomates	4 a 6	6 a 8 L/ha	Aplicar desde el cuaje del 2º al 5º racimo cada 5 a 7 días.
Ajos y cebollas	2	5 L/ha	Aplicar 30 y 15 días antes de cosecha.
Hortalizas y Papas	2 a 3	3 a 5 L/ha	Aplicar desde 1/3 de desarrollo del cultivo sobre la hiler, cada 10 a 15 días.

Precauciones

Basfoliar K Premium SL es un producto ecológicamente compatible y biodegradable en el medio ambiente, que no presenta restricciones de carencia.

Basfoliar K Premium SL es considerado no tóxico para las plantas y animales. Por lo tanto para el manejo seguro es necesario atenerse a las precauciones de uso de los productos fitosanitarios con que haya sido mezclado **Basfoliar K Premium SL**.