

EXPERTS FOR GROWTH



# Basfoliar<sup>®</sup> Mg Flo

Fertilizante Foliar  
con alto contenido de Magnesio.

[www.compo-expert.cl](http://www.compo-expert.cl)

# Basfoliar® Mg Flo

## Fertilizante Foliar, líquido-floable

- Fertilizante Foliar líquido-floable con alta concentración de Magnesio
- Especialmente desarrollado para aplicaciones de bajo volumen.
- Corrector de deficiencias de Magnesio de rápida eficacia.
- Producto apto para el uso en máquina electrostática.



## Composición

Magnesio 300 g/L (30%)

## Recomendaciones de Uso

Cultivo	Dosis/ aplicación	Nº de aplicaciones	Epoca de aplicaciones	Mojamiento L/ha de agua
Cítricos	6 L/ha	2	En los flujos de crecimiento de otoño y primavera.	2.000 +
Paltos	6 - 7 L/ha	2	En los flujos de crecimiento de otoño y primavera.	1.500
Uva de mesa y vinífera	5 L/ha	2	Desde grano de 10 -14mm hasta pre-pinta. En uva vinífera se puede aplicar hasta 15 - 30 días antes de cosecha.	1.000
Aumento de sólidos solubles en uva vinífera	4,5 L/ha	3	1ª 15 días antes de pinta. 2ª en pinta. 3ª 15 días después de pinta.	800 - 1.000+
Prevención de palo negro en uvas	4,5 L/ha	3	1ª en cuaja. 2ª en cierre de racimos. 3ª Pre- pinta*.	1.000
Kiwis	3-3,5 L/ha	3	A partir de caída de pétalos y repetir 30, 40 y 50 días después de plena flor.	800-1.200
Pomáceas	5 L/ha	2-3	Aplicar cada 15 días en huertos con niveles bajos de Magnesio en análisis foliar, última aplicación a fines de diciembre. En Granny Smith realizar 3 a 4 aplicaciones hasta el 30 de diciembre.	1.000 +
Carozos	6,5 L/ha	3	Desde endurecimiento de carozo, cada 15 días.	1.000 +
Nogal	4,5 L/ha	2-3	Follaje y fruto en crecimiento durante el verano	1500-1800
Avellano Europeo	1 L/ha	3-4	Diciembre - enero cada 10 días	1500
Almendro	6 a 7 L/ha	3	Flujos de crecimiento de follaje, en primavera, verano y otoño	1500-1800
Berries (arándanos, frambuesas, frutillas).	2-3 L/ha	2-3	Aplicar en brotación y/o cuaja.	400-800
Hortalizas	3 L/ha	3	Desde 4 a 6 hojas.	100 - 200
Lechugas y zanahorias	4-8 L/ha		10 a 14 días post trasplante o emergencia, luego cada 7 a 10 días, según deficiencia.	200 +
Cereales	1,5 L/ha	1	Entre inicio y fin de macolla.	30 - 50
Papas	4-8 L/ha	2	1 semana después del 100% de la emergencia, repetir 14 días después.	100 - 200
Arvejas y porotos	5 L/ha	1-2	Desde 6 hojas verdaderas.	100 +

\*En uva de color realizar la última aplicación con bayas de máximo 8-10 mm.

## Compatibilidad

**Basfoliar Mg flo** es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso convencional. No mezclar con **Basfoliar Ca SL** o **Basfoliar Ca WP**.