

Basfoliar® Mg WP



Fertilizante foliar

■ Nombre Comercial	Basfoliar® Mg WP
■ Nombre Químico	Polvo fino amorfo de naturaleza inorgánica en base a sales y óxido de magnesio
■ Nombre Común	Basfoliar® Mg WP
■ Grado	AGRICOLA
■ Comercializado por	COMPO EXPERT Chile Fertilizantes Ltda.

ANÁLISIS QUÍMICO

Magnesio 400 g/Kg (40 % Mg p/p)

ANÁLISIS FÍSICO

APARIENCIA	Sólido blanco, inodoro
DENSIDAD a 20°C	0,4 mg/cc
pH (Sol. 50g/L H2O) (20°C)	8,2
TOXICIDAD	MODERADAMENTE TÓXICO, NO ES INFLAMABLE, NO CORROSIVO Y NO PELIGROSO
EMPAQUES	Sacos de 25 y 5 kg.

BENEFICIOS :

- El Magnesio es el constituyente central de la molécula de clorofila, por lo tanto es indispensable para una buena fotosíntesis.
- Aumenta la producción de carbohidratos en la planta, mejorando el contenido de azúcares de la fruta.

DESCRIPCIÓN

- Basfoliar® Mg WP es un fertilizante foliar polvo mojable de alta concentración (40%)
- Basfoliar® Mg WP es un producto Corrector de deficiencias de magnesio de gran eficiencia para especies frutales y cultivos.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Dosis/aplic.	Nº aplic.	Época
Pomáceas	5 kg/ha	2-3	Desde fruto de 3 cm. hasta inicio de la toma de color, cada 10 – 15 días.
Carozos	5 kg/ha	2-3	Desde endurecimiento del carozo hasta inicio de toma de color, cada 10 días.
Parronales y viñas	2 – 2,5 kg/ha	1	Pre -floración; Al observar clorosis temprana, a partir de brotes de 30 cm.
	4 – 5 kg/ha	2-3	Preventivo: desde baya cuajada a antes de pinta. Para atenuar Necrosis de raquis (“palo negro”), bayas acuosas y bayas débiles. Complementar con Basfoliar Qualität SL desde pinta a cosecha.
Kiwis	2,5 kg/ha	1 a 2	Mejorar fotosíntesis. Desde brote de 30 cm. A partir del 5 – 10 de Octubre
Almendros y nogales	4 a 5 kg/ha	2-3	Desde formación del fruto hasta 20 -25 días antes de la cosecha.
Post -cosecha de frutales de hoja caduca	5-6 kg/ha	1-3	Post -cosecha. Desde 30 días antes del inicio de la caída de hojas, para atenuar la caída prematura de hojas.
Cítricos y Paltos	5-6 kg/ha	2	1ª: Flujo de crecimiento de brotes de primavera (brotes nuevos). 2ª: Flujo de crecimiento de brotes de otoño (brotes nuevos).
Hortalizas y cultivos	2-2,5 kg/ha	2-3	Cada 7 -10 días.
Berries	2,5-3 kg/ha	2-3	Post -floración y post-cosecha

PRECAUCIONES

Basfoliar® Mg WP es un fertilizante foliar inorgánico, no está sujeto a exigencias de residuos ni a períodos de carencia. Sin embargo en frutales de carozo se recomienda suspender las aplicaciones tres semanas antes de cosecha, ya que pueden quedar depósitos visibles.

Basfoliar® Mg WP es considerado no tóxico. Por lo tanto, para el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso del o los productos fitosanitarios con que sea mezclado Basfoliar® Mg WP.

Basfoliar® es marca registrada de COMPO EXPERT GmbH.