


EXPERTS FOR GROWTH



**COMPO  
EXPERT®**



# Zitrilon® 7 SL

Concentrado soluble de alta pureza  
para uso en fertirriego.

(7% Zn-EDTA)

[www.compo-expert.cl](http://www.compo-expert.cl)



# Zitrilon® 7 SL

Concentrado soluble de alta pureza para uso en fertirriego.

**Zitrilon 7 SL** contiene Zinc quelatizado (7% Zn - EDTA) y está especialmente formulado para prevenir y corregir deficiencias de Zinc en plantas, debido a que no existen estados asimilables de este elemento en el suelo.

**Zitrilon 7 SL** puede ser disuelto en agua completa y rápidamente, sin dejar residuos.

## Recomendaciones de uso para fertirriego

Es necesario conocer las condiciones locales de cada cultivo para recomendar dosis, momento y modo de aplicación más precisos.

Vía Suelo (*)	Dosis/Aplic. L/ha	Nº de Aplic.	Observaciones
Frutales de hoja persistente	25 a 50	1 a 4	Aplicar de preferencia en primavera y otoño en los flash de crecimiento radical y brote rojo en paltos.
Frutales de hoja caduca y vides	25 a 50	2 a 4	Aplicar de preferencia entre primavera - verano en flash de crecimiento radical.
Hortalizas	25 a 30	1 a 2	Se recomienda aplicar en suelos pobres, alcalinos durante el crecimiento vegetativo. En cultivos de semilla aplicar en la etapa de floración.

(\*) En fertirriego la aplicación debe hacerse lo más concentrada posible en el estanque madre (no diluir a más del 50%) e inyectar en el último tercio del tiempo de riego (no más de 1 hora), dejando al menos 45 minutos de riego posterior para el lavado de tuberías.



## Recomendaciones de uso para aplicación foliar

Cultivo	Dosis/Aplic. L/ha	Nº Aplic.	Observaciones
Uva.	1,5	3	Aplicaciones con brote de 20 cm cada 10 días, hasta inicio de flor.
Kiwi.	0,6	2	Aplicar desde brote de 20 cm. Cada 15 días. Mojamiento de 600 a 800 L.de agua/ha.
Carozos.	1	3	Brote de 10-15 cm repitiendo cada 15 días. Post cosecha, aplicar 2 L/ha.
Avellano Europeo	1	3	Brote de 10-15 cm. repitiendo cada 15 días. Post cosecha, aplicar 2 L/ha.
Berries (Arándanos, Frambuesas, Frutillas).	0,5 a 0,8	1 a 2	Aplicar con brote activo antes de floración.
Pomáceas.	1 - 1,5	4	Primera: puntas verdes (Oreja de ratón). Segunda con fruto de 2 a 3 cms. y repetir cada 10 días. Post cosecha, aplicar 2 L/ha.
Nogal.	1,5 - 2	3	Primera aplicación a inicio de flor pistilada, y repetir cada 15 días. Post cosecha, aplicar 2 L/ha.
Paltos y Cítricos.	2	2	Flujos de crecimiento de primavera y otoño, (brotes nuevos).
Hortalizas y Cultivos.	1 - 1,5	1 - 3	Dependiendo de la necesidad del cultivo y estado fenológico. (ver ficha técnica).