



COMPO EXPERT
PACK
NUTRITION

-  **Basacote® Plus**
-  **Blaukorn® Classic**
-  **Hakaphos®**
-  **Basfoliar® Kelp**
-  **Basfoliar® Algae**
-  **Basfoliar® Ca**
-  **Novatec® Solub 14-48**

COMPO EXPERT PACK NUTRITION FRUTILLA

FOLIARES	Basfoliar® Kelp		Basfoliar® Ca + Basfoliar® Algae	Basfoliar® K + Basfoliar® Ca
ETAPAS				
				
	Inicio del cultivo	Transplante	Crecimiento Vegetativo - Floración	Producción
SUELO	Basacote® Plus 3 M Blaukorn® Classic 12-8-16		Basfoliar® Kelp Hakaphos® Violeta Novatec® Solub 14-48	Hakaphos® Verde Hakaphos® Rojo Novatec® Solub 14-48
			Hakaphos® Verde Hakaphos® Rojo Novatec® Solub 14-48	Hakaphos® Amarillo Hakaphos® Naranja Novatec® Solub N Mag

Recomendación de aplicación a suelo

PRODUCTO	DOSIS	MOMENTO
Basacote® Plus 3 M	200-400 kgs/ha	Cuchareo
Blaukorn® Classic 12-8-16	200 kgs/ha	Cuchareo
Basfoliar® Kelp	1 a 2,5 %	Sumergir el plantín durante 10 minutos
Novatec® Solub 14-48	50-100 kg/ha	Realizar 2 a 3 aplicaciones durante el ciclo del cultivo
Hakaphos® Verde	0,4-0,6 kgs/1000 m ² /día	Aplicar en crecimiento vegetativo
Hakaphos® Rojo	0,4-0,6 kgs/1000 m ² /día	Aplicar en inicio de Floración
Hakaphos® Amarillo/Naranja	0,4-0,6 kgs/1000 m ² /día	Aplicar desde los 30 días del transplante, durante todo el ciclo
Novatec® Solub N Mag	0,5 kgs/ 1000 m ² /día	Aplicar desde los 30 días del transplante, durante todo el ciclo

Según el equipo de dosificación, la forma de fertilizar será la siguiente: Bomba dosificadora o sistema tipo "Venturi" • Preparar una disolución concentrada disolviendo 15kg de Hakaphos® por cada 100 litros de agua • Agitar la solución hasta su disolución • Regular el dosificador para conseguir la concentración final deseada (normalmente entre 0,5 y 2 gramos de Hakaphos® por litro de agua). Dada la estabilidad de la solución de Hakaphos®, pueden prepararse soluciones concentradas para una semana. En este caso es conveniente agitar antes de iniciar el riego.

Importante: Es conveniente empezar el riego con agua sola, posteriormente añadir la solución nutritiva a las dosis correspondientes y finalizar el riego aplicando de nuevo 10 ó 15 minutos de agua sola, para limpiar las tuberías y emisores de riego.

Recomendación de aplicación foliar

PRODUCTO	DOSIS	MOMENTO
Basfoliar® Kelp	500 cc/100 lts	A los 20 días de transplante Luego de cada cosecha
Basfoliar® Ca	300 a 500 cc/100 lts	1 vez por semana durante el crecimiento vegetativo del cultivo y en etapa de plena producción
Basfoliar® Algae	1 a 3 lts/ ha	1 vez por semana durante el crecimiento vegetativo del cultivo
Basfoliar® K	1,5 a 2,5 kgs/ha	1 vez por semana durante plena producción del cultivo

Nota: La información contenida en este folleto, es netamente orientativa. Para una correcta dosificación, uso y momento de aplicación de los productos citados consulte con su Ingeniero Agrónomo o Técnico asesor.