



Triabon® (16+8+12+4 MgO)

De NPK-voorraadmeststof met een goede aanvangswerking en een uitgesproken lange nawerking.

Voordelen:

- Bevat 70% van de totale stikstof onder vorm van langwerkende CrotoDur®, en werkt volledig onafhankelijk van de pH-waarde van de grond, zonder risico op verbranding van de bovengrondse plantendelen.
- Kan gebruikt worden in zure substraten *Erica*, *Calluna*, *Rhododendron*, *Cytisus*.
- Zorgt voor een lang aanhoudende en regelmatige afgifte van de stikstof in de bodemoplossing, zonder uitspoeling.
- Kan toegepast worden als inmenging in de potgrond en als bijbemesting op de pot.
- Universeel aanwendbaar als langwerkende meststof voor alle containerteelten, balkonplanten, openbaar groen en puntdosering bij bepaalde vollegrondsteelten.
- Bevat alle sporenelementen in aangepaste hoeveelheden voor substraatteelten. Triabon® is een gekorrelde NPK - voorraadmeststof met een werkingsduur van 3 tot 4 maanden. De werking is ook bij lagere temperaturen uitstekend.



Triabon® bevat alle voedingsstoffen voor de gezonde groei van de plant. In tegenstelling tot de omhulde meststoffen zijn bij Triabon® de hoofd- en sporenelementen meteen beschikbaar voor een goede start. Alleen de uitspoelingsgevoelige stikstof wordt vastgehouden en langzaam omgezet. Bovendien kan Triabon® gecombineerd worden met Basacote® Plus voor toepassing in gewassen met een langere teeltduur.



Verpakking: zak 25kg
Verkoopeenheid: 40 x 25kg
Korrelgrootte: 90% tussen 0.7 -2.8 mm
Korrelkleur: wit-grijs

Declaraties

16%	Stikstof (N) totaal
	5% Ammoniumstikstof
	11% Crotodur (Crotonylidiureum)
8%	Fosforzuuranhydride (P ₂ O ₅) oplosbaar in water en neutraal ammoniumcitraat
	6% Fosforzuuranhydride (P ₂ O ₅) oplosbaar in water
12%	Kaliumoxide (K ₂ O) oplosbaar in water
4%	Magnesiumoxide (MgO) totaal
	3.0% Magnesiumoxide (MgO) oplosbaar in water
0.02%	Boor (B)
0.04%	Koper (Cu)
0.1%	IJzer (Fe)
0.1%	Mangaan (Mn)
0.015%	Molybdeen (Mo)
0.007%	Zink (Zn)
	Chloorvrij

Aanbevelingen

<i>Aanbevolen hoeveelheid</i>	<i>Dosering g/l of kg/m³ -substraat</i>
Boomkwekerijen: container (op de pot leggen) 1. Jonge planten of gewortelde stek 2. Teelt in eindpot - Als bijbemesting (juni-juli) - Zonder basisbemesting (in 2 tot 3 maal doseren)	0,5-1,0 1,0 - 2,0 afhankelijk van het gewas 2,0 - 5,0 afhankelijk van het gewas
In combinatie met Basacote® Plus 6M of 9M. Ingemengd en ter vervanging van de PG-MIX. Voor teelten met een uitgesproken groeistart met het belang van een goede beworteling.	Februari - Maart 0,5 - 1,0 Triabon® + 2,0 - 2,5 Basacote® 9M April – Mei 0,5 - 1,0 Triabon® + 1,5 - 2,0 Basacote® 6M
Balkonplanten en plantbakken 1. Soorten met lage behoeften 2. Soorten met hoge behoeften	1,0 – 1,5 1,5 – 2,0