



# Programa Nutricional Foliar COMPO EXPERT para Pomáceas



Productos	Dosis por aplicación kg-L / ha	Dosis por aplicación g-cc/hl	Nº Aplic.	Época Aplicación / dosis ( kg-Lt/ha)							
				Aplicación 1	Aplicación 2	Aplicación 3	Aplicación 4	Aplicación 5	Aplicación 6	Aplicación 7	Aplicación 8
				Puntas verdes oreja de ratón	Botón rosado	Plena flor	Post cuaja	Fruto en crecimiento (10 mm)	Fruto en crecimiento (30 mm)	Pre cosecha (60 días antes)	Post cosecha
<b>Basfoliar® Ca premium SL (18% p/v CaO)*</b>	4 a 6 L	300 cc	3		4 L	4 L	6 L				
<b>Basfoliar® Ca SL (23,8% p/v CaO)*</b>	6 L	300 cc	2					6 L	6 L		
<b>Basfoliar® Mg Premium SL (12% p/v MgO)</b>	4 L	200 - 300 cc	2							4 L	4 L
<b>Basfoliar® Boro SL (13,3% B)**</b>	1 a 2 L	80-140 cc	2		1 L	1L					2 L
<b>Solubor® PS (20,5% p/p B)**</b>	1,5 a 2 kg	80-140 g	2		1 kg	1kg					2 kg
<b>Basfoliar® Zn 75 Flo***</b>	0,5 a 1 L	50-100 cc	1								1 L
<b>Basfoliar® Zn Premium SL (7% p/v Zn)***</b>	0,5 a 1,2 L	50 a 100 cc	6	0,5 L	0,5 L		1 L	1,2 L	1,2 L	1,0 L	
<b>Basfoliar® Kelp SL****</b>	2 L	300 cc 500 cc	4		2 L	2 L					2,0 L
<b>Basfoliar® Size SL****</b>	1 L	150 cc 250 cc	4		1 L	1 L					1,0 L
<b>Basfoliar® K Premium SL (25% p/v K<sub>2</sub>O)</b>	6 a 8 L	400 a 500 cc	3								6,0 L
<b>Basfoliar® Algae SL</b>	3 a 6 L	200 cc 300 cc	3	3 L	3 L	3 L	3 L	3 L	3 L		
<b>Basfoliar® 25-10-17 PS</b>	1,5 a 2 kg	80 a 100 g	3				2 kg	2 kg	2 kg		
<b>Vitanica® RZ</b>	8 a 10 L	400 cc	2								8,0 L
<b>Invelop® White Protect</b>	30 a 50 kg	2								50 kg	
<b>Basfoliar® Buffer SL</b>	100 cc/hl			La dosis se determina en base a pH objetivo buscado, para lograr máxima eficiencia de nutrientes y moléculas de uso agrícola , para dosis precisas contactar a zonal COMPO EXPERT.							

\*Uso de Basfoliar Ca premium SL ó Basfoliar Ca SL, elegir uno de ambos de acuerdo a recomendación de preferencia. Repetir hasta 7 veces, dependiendo de presión de Bitter pit cada 10 a 15 días (mas repeticiones en condiciones susceptibles)

\*\*Uso de Basfoliar Boro SL ó Solubor PS, elegir uno de ambos de acuerdo a recomendación de preferencia.

\*\*\*Uso de Basfoliar Zn premium SL ó Basfoliar Zn 75 Flo, elegir uno de ambos de acuerdo a recomendación de preferencia.

\*\*\*\*Uso de Basfoliar Size SL ó Basfoliar Kelp SL, de acuerdo a recomendación de preferencia.

• Considerar aplicaciones de Potasio (Basfoliar K Premium SL) 60-45-30 y 15 días antes de cosecha.

• Para aplicaciones de Basfoliar Mg Premium SL, en variedades tardías completar 4 aplicaciones cada 10 días.

• Comenzar con Invelop previo a cosecha en período de alta susceptibilidad a golpe de sol por radiación y alta temperatura.