

Basfoliar® Zn Premium SL



Fertilizante foliar corrector líquido

- Nombre Comercial Basfoliar® Zn Premium SL
- Grupo de Producto Fertilizante Foliar de Zinc SL
- Tipo Zinc, Manganeseo y Molibdeno en solución acuosa, con equilibrio buffer ácido y multi co-formulantes (Polioles, Ácidos polihidroxicarboxílicos, Carbohidratos)
- Grado AGRICOLA
- Comercializado por COMPO EXPERT Chile Fertilizantes Ltda.

ANÁLISIS QUÍMICO

Zinc Total	expresado como Zn	7,0% p/v
Molibdeno	expresado como Mo	0,3% p/v
Manganeseo	expresado como Mn	1,6% p/v
L-alfa-aminoácidos Totales *		2,0% p/v
Extracto natural de algas <i>Ecklonia maxima</i>		10,0% p/v
Carbono Orgánico 100% Soluble***	expresado como (C)	8,1% p/v

* L-alfa-aminoácidos naturales (no sintéticos), proveniente exclusivamente de Basfoliar Amino Premium SL

** Extracto de alga *Ecklonia maxima* proveniente exclusivamente de Basfoliar Kelp SL

*** Σ Carbono derivado exclusivamente de poli alcoholes. Ácidos poli hidroxicarboxílicos, carbohidratos y L-alfa aminoácidos.

ANÁLISIS FÍSICO

APARIENCIA	Líquido Marrón / Verde oscuro
DENSIDAD p a 20°C	1.260 g/L
pH* al 0,1% v/v, Agua Destilada 20°C	2,7
pH** al 0,1%v/v En Agua agrícola 20°C	6,8

*Medición realizada en agua destilada de pH 5,7

**pH en Agua de Uso Agrícola, es la medición COMPO EXPERT que permite visualizar el comportamiento real en condiciones de Campo, de su efecto buffer acidificante, considera una agua Tipo, de pH inicial 7,9, CE aprox. 0,7 dS/M 20°C y Nivel de Bicarbonatos de 2 mmol/L.

TOXICIDAD	MODERADAMENTE TÓXICO, NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO Y NO PELIGROSO
EMPAQUES*	Envases plásticos de 5, 20 y 200 Litros.

*En Chile, sólo disponible en bidón plástico de 20 L.

DESCRIPCIÓN

Basfoliar®Zn Premium SL es un fertilizante foliar líquido del tipo solución acuosa (No floable) con 7%p/v de Zinc (Expresado como Zn), 2% de Manganeso (Expresado como Mn) y 0,3% de Molibdeno (Expresado como Mo), equilibrio especialmente desarrollado para frutales, hortalizas y cultivos de alto potencial productivo. Basfoliar® Zn Premium SL aporta significativas cantidades starter de Molibdeno (0,3%p/v Mo) a inicios de temporada, para optimizar el metabolismo del N-NO₃ en hojas (Enzima nitrato reductasa), especialmente en primavera de bajas temperaturas. El manganeso que contiene Basfoliar® Zn Premium SL está considerado para lograr un real efecto starter de manganeso especialmente en frutales injertados sobre portainjertos con marcado desfase de brotación radicular en relación a la brotación de la variedad productiva. No obstante, en frutales donde hay un caso específico de mayor magnitud del déficit de manganeso, COMPO EXPERT sugiere evaluar el uso de Basfoliar® Mn Zn Premium SL, que contiene 7% de Mn, 4% de Zn y 0,1% de Mo.

La absorción foliar de Basfoliar® Zn Premium SL es potenciada mediante un cuidado equilibrio químico de ingredientes y co-formulantes como ácidos carboxílicos, polioles, carbohidratos, L-Alfa aminoácidos proveniente de Basfoliar® Amino Premium SL y 10% v/v de Basfoliar® Kelp SL, que potencian la absorción de Zinc, inclusive en condiciones adversas de baja humedad relativa ambiental. El carbono 100% hidrosoluble proviene exclusivamente de poli alcoholes, ácidos carboxílicos, L-Alfa-Aminoácidos y carbohidratos, alcanzado 9,6%p/v de carbono.

Basfoliar® Zn Premium SL tiene alta tasa de absorción de Zinc, lo cual permite alcanzar alta tasa de crecimiento en hojas y brotes en condiciones adversas de baja humedad relativa, bajas temperaturas primaverales. Los componentes de Basfoliar® Zn Premium SL han sido cuidadosamente seleccionados para obtener un fertilizante foliar Premium de Zinc, en equilibrio con otros micronutrientes que son necesarios bajo condiciones como las descritas anteriormente y/o en frutales con manejo agronómico para estimular una brotación del follaje adelantada y/o para frutales sobre porta injertos con marcado desfase de brotación aérea y radicular.

Basfoliar® Zn Premium SL incorpora en su formulación sustancias tampón que le otorgan un significativo efecto buffer ácido, esto además permite mayor rango de compatibilidad química en relación a productos que no incorporan esta característica en su formulación, especialmente importante en aguas de pH Alcalino (>7,0) y que además sean duras (alto contenido de iones Ca⁺² y Mg⁺²) y/o en aplicaciones de bajo volumen.

Basfoliar® Zn Premium SL, utilizado en dosis y frecuencias indicadas, es corrector de deficiencias de Zinc, de rápida absorción, alta eficacia y de alta seguridad en comparación a otras formulaciones foliares en su categoría. Aun así, la recomendación COMPO EXPERT es siempre respetar las dosis de aplicación, frecuencia y aplicar bajo un concepto preventivo, puesto que el Zinc es un micronutriente que limita drásticamente el rendimiento y actuar bajo estrategia preventiva siempre será más rentable que actuar en forma correctiva con síntomas visuales por causa de la deficiencia de Zinc.

RECOMENDACIONES DE USO:

En frutales de alto potencial productivo y/o zonas de favorables condiciones de temperatura, las necesidades de Zinc son mayores en relación a condiciones productivas promedios. Las aplicaciones preventivas de Zinc con Basfoliar® Zn Premium SL, deben sumar como mínimo 0,4 kg de Zn elemento/ha/temporada, lo cual equivale como mínimo a 6 L/ha/temporada de Basfoliar® Zn Premium SL.

Cultivo	Concentración/ aplicación	Dosis maxima por aplicación L / ha	N° aplic.	Época de Aplicación
Uva de mesa*, Uvas Pisqueras	180-200 cc/100L	2,0	1	1ª aplicación en brotes de 15 -40 cms.
	150 cc /100L	2,0	1	2ª aplicación en brotes de 41 -70 cms.
	200-220 cc /100L	3,0	1	3ª aplicación en brotes de > 70 cms en Pre flor.
	130 cc/100L	2,0	1	4ª Aplicación en Post Cuaja.
	60-90 cc/100L	1,5	1	5a Aplicación, Bayas desde 6 mm. Si requiere mayores aplicaciones aun, Basfoliar® Zn Premium SL , bajo condiciones de alto stress por radiación y/o extra alto rendimiento, su formulación es totalmente segura para aplicaciones Post Cuaja, no deja residuos ni manchas en frutas y es altamente compatible.
Vid vinífera	100 - 200 cc/100L	2,5	3	1a aplicación con brote de 30 cm, 2a brotes de 60 cm y la 3a aplicación a inicios de flor. Si existen antecedentes de deficiencia partir con brote de 15 cm. En vides viníferas de alta producción > 29 TM/Ha, preferencia a usar dosis en rango alto.
Durazneros, nectarines, almendros	120 - 140 cc/100L	1,1	3	Aplicar en 3 oportunidades, partiendo con brote de 5 a 10 cm, repitiendo cada 10 a 15 días, llegando a los 4,5 L/ha de producto comercial en la primavera.
	120 - 140 cc/100L	1,4		
	120 - 140 cc/100L	1,7		
	120 - 140 cc/100L	1,8	1	Aplicar en otoño (marzo) con hoja verde activa, sólo si análisis de lámina indicó menos de 25 ppm de Zn.
Cerezos (Flor)	100 cc/100L	1	1	Aplicar con mojamiento adecuado para cubrir el 100% del volumen de copa de acuerdo al sistema de conducción.
Cerezos	120 a 140 cc/100L	2,1	3	Aplicar desde brote de 10-15cm y repetir cada 10-15 días. En postcosecha aplicar en otoño (marzo) si el análisis indica menos de 25 ppm.

Ciruelos	100 - 120 cc/100L	1,0	1	Aplicar en 2 ó 3 oportunidades, partiendo con brotes de 5 a 10 cm, repitiendo cada 10 a 15 días, llegando a los 3,5 L /ha de producto comercial en la primavera.
	100 - 120 cc/100L	1,2	1 o 2	
	100 - 120 cc/100L	1,5	1	Aplicar en otoño (marzo) con hoja verde activa, sólo si análisis de lámina indicó menos de 25 ppm de Zn.
Pomáceas	90 - 120 cc/100L	1,2	1	Desde Brotación hasta "Oreja de ratón" con mojamiento aprox. de 1.200 L /ha. (Noviembre).
	50 cc/100L	0,75	3	Desde fruto de 1 cm. Aplicando cada 15 días.
	50-100 cc/100L	1,2	2	Periodo de mayor radiacion (enero) cada 15 días
	200 cc/100L	3,0	1	Pstcosecha, en otoño con hoja verde activa, sólo si análisis de lámina indicó menos de 30 ppm de Zn.
Cítricos	100 - 140 cc/100L	3,5	2	Minimo 2 aplicaciones en flujos de crecimiento de brotes de primavera. Suficiente con mojar periferia del árbol. Es probable que requiera adicionar Manganeso
	100 - 140 cc/100L	3,5	2	Minimo 2 aplicaciones en flujos de crecimiento de brotes de fin de verano-Principio de Otoño. Suficiente con mojar periferia del árbol. Es probable que requiera adicionar Manganeso.
Paltos	150 - 180 cc/100L	4,0	2	Aplicar a inicio de panícula floral expuesta y repetir en plena flor.
	150 - 180 cc/100L	4,0	2	Minimo 2 aplicaciones en flujos de crecimiento de brotes de fin de verano-Principio de Otoño. Suficiente con mojar la periferia del árbol.
Kiwi	140 - 180 cc/100L	1,6	3	Aplicar desde brote de 20 cm cada 15 días (mojamiento de 600 a 800 L/ha).
Nogales	120 - 150 cc/100L	2,5	3	Realizar la 1ª aplicación en inicio de flor pistilada y repetir cada 15 días.
	120 - 150 cc/100L	2,5	1	Aplicar en otoño (marzo) con hoja verde activa, sólo si análisis de lámina indicó menos de 25 ppm de Zn.
Avellano Europeo	150-200 cc/100 L	2,5	3	Aplicar desde cuaja hasta desarrollo de frutos. (Aplicaciones constantes ayudan a minimizar el efecto fotooxidativo - golpe de sol)

Olivos	250 - 300 cc/100L	3,5	2 o 3	Aplicar en flujos de crecimiento de brotes de primavera hasta antes de floración mezclado con Solubor®. Se puede repetir en otoño si los niveles son bajos.
Arándanos (frambuesas, frutillas)	200 - 250 cc/100L	2,0	2	Aplicar con brote activo, desde crecimiento vegetativo.
	200 - 250 cc/100L	2,0	1	Post cosecha.
Viveros y Plantaciones nuevas	150 - 200 cc/100L	1,5	2 o 3	Aplicar desde brote de 20 cm cada 15 días.
Ajo, cebolla	400 - 500 cc/100L	3,0	3	30 y 60 días después del trasplante
Papas > 40 TM/HA	250 - 300 cc/100L	2,0	3	Aplicar desde primera desinfección de follaje y repetir cada 7 ó 10 días hasta completar programa
Tomate (hasta 140 TM/HA)	250 - 300 cc/100L	2,4	4	Aplicar desde primera desinfección de follaje y repetir cada 10 ó 15 días hasta completar programa
Hortalizas de Hoja	200 - 250 cc/100L	1,5	2 o 3	Desde brote activo y repetir cada 10 a 15 días.
Maíz Industrial - Maíz Dulce	500 - 600 cc/100L	2,5	2 o 3	Aplicar a partir de primera etapa de crecimiento (su uso es compatible con herbicidas).

*En Uvas de mesas de extra alta producción y/o alta precocidad, COMPO EXPERT sugiere usar siempre las dosis más altas. El Zinc es un nutriente especialmente documentado en permitir activar autoprotección contra radicales libres como los que se esperan como consecuencias del alto estrés por radiación solar. COMPO EXPERT ha confirmado en numerosos ensayos, que aplicaciones de Basfoliar® Zn Premium SL a las dosis recomendadas es muy seguro y es posible su aplicación sin restricción para este propósito. Si necesita aplicar mayor Nivel de Zn, dada la eficacia de Basfoliar® Zn Premium SL, aconsejamos revisar su estrategia, no obstante desde el punto de vista seguridad si es posible, pero solo es una indicación, ya que las dosis indicadas han sido cuidadosamente testeadas y cubren adecuadamente las necesidades de Zinc, aun bajo condiciones adversas de baja humedad relativa.

Basfoliar® Zn Premium SL : Dosis para estrategia COMPO EXPERT de Nutrición Floral para potenciar Cuaja en frutales con semilla

Cultivo	Época	Basfoliar® Zn Premium SL	Basfoliar® Ca Premium SL	Basfoliar® Kelp SL o Basfoliar® Size SL	Basfoliar® B SL / Solubor®
		Zinc	Calcio	Extracto Alga <i>Ecklonia</i>	Boro
Nogal	Aparición de flores pistiladas	1,5 L/ha	3,0 L/ha	4L/ha/Apl. ó 2 L/ha/Apl.	0,7-1,2 L/ha Apl. ó 0,7-1,2 Kg/ha/Apl.
Almendro	Inicio de Floración	1,5 L/ha	3,0 L/ha	4L/ha/Apl. ó 2 L/ha/Apl.	0,7-1,2 L/ha Apl. ó 0,7-1,2 Kg/ha/Apl.
Palto	Inicio de Floración	1,5 L/ha	3,0 L/ha	4L/ha/Apl. ó 2 L/ha/Apl.	0,7-1,2 L/ha Apl. ó 0,7-1,2 Kg/ha/Apl.
Uva de Mesa con Semilla	Inicio de Floración	1,5 L/ha	3,0 L/ha	4L/ha/Apl. ó 2 L/ha/Apl.	0,7-1,2 L/ha Apl. ó 0,7-1,2 Kg/ha/Apl.
Uva Pisquera con Semilla	Inicio de Floración	1,5 L/ha	3,0 L/ha	4L/ha/Apl. ó 2 L/ha/Apl.	0,7-1,2 L/ha Apl. ó 0,7-1,2 Kg/ha/Apl.
Uva Vinífera	Inicio de Floración	1,0 L/ha	3,0 L/ha	4L/ha/Apl. ó 2 L/ha/Apl.	0,7-1,2 L/ha Apl. ó 0,7-1,2 Kg/ha/Apl.

NOTA 1: Mejorar la cuaja, implica potencialmente aumento de rendimiento y esto, implica mayor demanda de nutrientes y por tanto ajustar el programa de Fertirriego proporcionalmente al alza de la mayor producción proyectada, esto, a través de la fertilización vía suelo N-P₂O₅-K₂O-MgO, en relación a situación inicial si no estaba previsto realizar la nutrición floral. COMPO EXPERT, sugiere como Fertilizante todo en uno para ajustar este efecto:

- Fertilizante de Ajuste por mayor cuaja en Cultivos en Fertirriego: [Fertilizantes con Tecnología NET] Novatec® Solub 16-10-17 o Novatec® Solub 10 0 32+2MgO
- Fertilizante de Ajuste por mayor cuaja en Cultivos de riego por surcos: [Fertilizantes con Tecnología NET] Novatec® Classic (12-8-16+3MgO) o [Fertilizantes con Tecnología 2NT] Duratec® TOP 14 (14-7-14+2Mg) o [Fertilizantes con Tecnología Twin Slow Release] Floranid® Twin Club (10-5-20+4MgO)

PRECAUCIONES

Bajo una condición correctiva, la dosis total por hectárea debe ser mayor en relación a dosis preventivas. En caso de tratamiento correctivo, con sintomatología visual ya presente, COMPO EXPERT recomienda aumentar el número de aplicaciones, pero en ningún caso sobrepasar las dosis máximas por aplicación, ya que fisiológicamente el Zinc es poco móvil y por tanto, la eficacia de la corrección de Zinc implica cubrir un mayor intervalo de tiempo con aplicaciones mientras exista crecimiento de brotes. Ante dudas, consulte al Departamento técnico de COMPO EXPERT sobre una estrategia específica de Basfoliar® Zn Premium SL en cuanto a dosis y frecuencia de aplicación bajo condición de corrección.

En Pomáceas, no sobrepasar las dosis máximas ya que el Zinc puede producir russet bajo ciertas condiciones. No aplicar en floración.

En Carozos, el Zinc puede producir caída de hojas si las dosis y/o la época de aplicación no es la adecuada, o si se aplica no habiendo deficiencia.

Las aplicaciones de post cosecha no aumentan en forma adecuada los niveles de Zinc para la primavera siguiente, por lo que se recomienda solamente aplicar en post cosecha si el nivel de Zinc C es menor a 25 ppm, en este caso de todas formas se debe realizar la aplicación de primavera.

RECOMENDACIONES DE APLICACION

Basfoliar® Zn Premium SL es un fertilizante foliar con características excepcionales para este propósito y está validado para los siguientes usos:

- Aplicaciones Foliar con volumen normal / estándar según cultivo
- Aplicaciones Foliar con Tecnologías de volumen reducido (60-100 L/ha) como electrostáticas, donde ha sido testeado en específico y es 100% apto para este uso. Sugerimos en este caso, no mezclar con otros fertilizantes foliar para mayor seguridad o bien, de ser requerido en mezcla, realizar prueba de compatibilidad previa o bien, consultar al departamento técnico COMPO EXPERT sobre una orientación específica, no obstante todos los fertilizantes de línea Basfoliar® Premium SL son altamente compatibles entre sí y por esta razón, siempre será una ventaja mezclar productos de la misma línea Basfoliar® Premium SL de COMPO EXPERT, respetando las Dosis de cada producto para el cultivo.
- Aplicaciones aéreas de ultra Bajo volumen como avión y helicóptero. Sin embargo, en este tipo de aplicaciones, sugerimos No mezclar con otros fertilizantes foliares o bien, hacer prueba previa. No obstante, para usar en mezcla más de 2 fertilizantes foliares, consultar al departamento técnico COMPO EXPERT sobre una orientación específica usos.

COMPATIBILIDADES

Basfoliar® Zn Premium SL por su exclusiva formulación buffer, ofrece mayor compatibilidad química en comparación a otros fertilizantes foliares de zinc en su categoría. Aun así, al mezclar sólo productos compatibles entre sí, evitar mezclar más de 4 productos para que esa mezcla quede lo más uniforme posible y se obtenga la mayor eficiencia de los productos aplicados.

Basfoliar® Zn Premium SL es compatible con la mayoría de los fitosanitarios de uso convencional. Por lo tanto, para el manejo del producto es necesario atenerse a las precauciones de uso de los productos fitosanitarios con los que haya sido mezclado. No obstante, COMPO EXPERT recomienda realizar pruebas de compatibilidad de las mezclas de cada caso particular.

En pruebas con principales fertilizantes foliares del tipo Solución Líquida a base de magnesio, tales como Basfoliar® Mg Premium SL, se ha observado que Basfoliar® Zn Premium SL tiene buena compatibilidad, esto implica que es compatible en mezclas para aplicaciones de alto volumen estándar o bien mezclas para aplicaciones de bajo volumen de mojamiento como por ejemplo, aplicación con electrostática.

Basfoliar® Zn Premium SL es parcialmente compatible con productos foliares que contengan Calcio en alta proporción en su formulación. La compatibilidad parcial implica que en aplicaciones de alto volumen estándar, Basfoliar® Zn Premium SL es compatible, pero en mezclas para aplicaciones de bajo volumen no se debe mezclar con ese tipo de productos, ya que bajo esa situación, la interacción entre Cationes /Aniones, se alcanza punto de saturación de la(s) nueva(s) especie(s) química(s) que se forma(n) y por causa del bajo volumen de solvente (agua), ocurre sedimentación, pero esto no ocurre en aplicaciones de alto volumen estándar, ya que no alcanza punto de saturación por existir suficiente solvente (Agua).

Basfoliar® es marca registrada de COMPO EXPERT GmbH.