



Programa Nutricional Foliar COMPO EXPERT para Paltos



Productos	Dosis por aplicación Kg-Lt / ha	Dosis por aplicación gr-cc/hl	N° Aplic.	Época Aplicación / dosis (kg-Lt/ha)					
				Aplicación 1	Aplicación 2	Aplicación 3	Aplicación 4	Aplicación 5	Aplicación 6
				Panicula Expuesta (estado coliflor)	Plena flor	Post cuaja	Inicio caída fisiologica	Crecimiento de fruta	Segundo flash vegetativo - Ajuste de carga
Basfoliar® Ca premium (18% p/v CaO) ó Basfoliar® Ca SL (23,8% p/v CaO)	4 - 6 L 4 L	250 - 300 cc 150 - 200 cc	3 3	4 L 4 L	4 L 4 L	4 L 4 L			
Basfoliar® Boro SL (13,3% B) ó Solubor® PS (20,5 p/v B)	1,5 - 2 L 1 - 1,5 Kg	120 - 160 cc 60 - 80 gr	3 2	1,5 L 1,2 Kg	1,5 L 1,2 Kg		2 L		
Basfoliar® Zn 75 flo (75 % p/v Zn) ó Basfoliar® Zn Premium SL (7%p/v Zn)	0,4 L 2 - 4 L	25 cc 150 cc	3 4	0,4 L 4 L	0,4 L 4 L	0,4 L 4 L			
Basfoliar® Kelp SL ó Basfoliar® Size SL	4 - 7 L 2 - 3,5 L	300 - 500 cc 150 - 250 cc	6 6	4 L 2 L	4 L 2 L	4 L 2 L	7 L 3,5 L	7 L 3,5 L	3 L
Basfoliar® K Premium SL (25% p/v K ₂ O)	8 - 10 L	400 - 500 cc	2				10 L	10 L	
Basfoliar® Molibdeno SL	0,5 L	25 cc	2				0,5 L		0,5 L
Basfoliar® OsmoProtect SL	5 L	300 cc	3				5 L	5 L	5 L
Basfoliar® 36 Extra SL	5 - 6 L	300 cc	3	6 L	6 L	6 L			
Basfoliar® Top N SL	6 a 10 L	300 a 500cc	3	10 L	10 L	10 L			
Basfoliar® Buffer SL	100 a 150 cc/hl		La dosis se determina en base a pH objetivo buscado, para lograr máxima eficiencia de nutrientes y moléculas de uso agrícola , para dosis precisas contactar a zonal COMPO EXPERT.						

Nutrición Floral corresponde a aplicaciones 1 y 2 (acompañar con Basfoliar extra SL solo en caso de alta floración).

En caso de huertos de alta carga, se recomienda repetir la aplicación 4 (crecimiento de fruta), cada 20 días.

El boro se recomienda complementar con aplicación vía riego de Solubor PS y Basfoliar Boro en dosis de 15 a 30 kg/há.