



Programa Nutricional Foliar COMPO EXPERT para Uva de Mesa



Manejo Integral
en Nutrición Vegetal



Productos	Dosis por aplicación kg-Lt / ha	Dosis por aplicación cgr-c/Hl	N° Aplic.	Época Aplicación / dosis (kg-Lt/ha)												
				Aplicación 1	Aplicación 2	Aplicación 3	Aplicación 4	Aplicación 5	Aplicación 6	Aplicación 7	Aplicación 8	Aplicación 9	Aplicación 10	Aplicación 11	Aplicación 12	Aplicación 13
				Brote 5-10 cm	Brote 20-40 cm	Brote 50-70 cm	Caliptra partida	25% flor	Plena flor	Post cuaja	Crecimiento bayas	Crecimiento bayas	Crecimiento bayas	Inicio de ablande	30 a 40% pinta	Postcosecha
Fetrilon® Combi 2	0,64 Kg	50 - 100 gr	3	0,64 Kg	0,64 Kg	0,64 Kg										
Basfoliar® Amino Premium SL ó	2 a 3 L	200 - 300 cc	3	2 L	3 L	3 L										
Basfoliar® Algae SL ó	3 a 4 L	200 - 300 cc	4	4 L	4 L	4 L										4 L
Basfoliar® Osmoprotect SL	3 a 4 L	200 - 300 cc	2	3 L	3 L											
Basfoliar® 10-4-7 SL	2,5 a 5 L	250 - 500 cc	1		2,5 L											
Basfoliar® Zn Premium SL (7%p/v Zn)	2 a 3 L	150 - 200 cc	5		2 L	2 L	3 L			2 L		1 L				
Basfoliar® Mg Premium SL (12%p/v MgO)	3 a 5 L	300 - 400 cc	6		3 L		3 L			4 L	4 L		4 L	3 L		
Basfoliar® Ca premiun (18% p/v CaO)	4 a 6 L	250 - 300 cc	4					4 L	4,L	4 L	4 L					
Solubor® PS (20.5% p/v B) ó	1 Kg	70 - 85 gr	1				1 Kg									
Basfoliar® Boro SL (13,3% p/v B)	2 a 3 L	120-160 cc	2				2 L			2 L						
Basfoliar® K Premium SL (25% p/v K ₂ O)	6 a 8 L	400 - 500 cc	4		6 L	6 L								6 L	6 L	
Basfoliar® Kelp SL ó	2 a 7 L	300 - 500 cc	12	2 L	2 L	2 L	2 L	2 L	2 L	7 L	7 L	7 L	2 L	2 L	2 L	
Basfoliar® Size SL	1 a 3,5 L	150 - 250 cc	12	1 L	1 L	1 L	1 L	1 L	1 L	3,5 L	3,5 L	3,5 L	1 L	1 L	1 L	
Basfoliar® 25-10-17 PS	4 Kg	300 gr	1													4 kg
Vitanica® RZ*	6 a 8 L	600 - 800 cc	3 a 5						6 L					8 L	8 L	
Vitanica® Si	3 L	200 - 300 cc	3										3 L	3 L	3 L	
Basfoliar® Molibdeno SL	0,5 a 1 L	50-100 cc	3						0,5 L				0,5 L			1 L
Basfoliar® Buffer SL	100 a 150 cc/hl			La dosis se determina en base a pH objetivo buscado, para lograr máxima eficiencia de nutrientes y moléculas de uso agrícola , para dosis precisas contactar a zonal COMPO EXPERT.												

* En caso de presión de pudriciones y variedades tardías se recomiendan 5 aplicaciones a dosis máxima.

** Aplicaciones: 10 días previo ablande y repetir las dos siguientes cada 7 días.



@compoexpertchile



compoexpertchile



@compoexpertchile



@compoexpertchile